



Provtagning för urinodling - mittstråleurin

Patientinformation från laboratoriemedicin på ryska

Инструкция для пациента

Пробирку для сбора мочи можно получить в лаборатории при поликлинике или в отделении больницы. Исключите употребление препаратов, содержащих витамин С (аскорбиновую кислоту), за сутки до сдачи анализа. Для достоверности результата анализа перерыв между мочеиспусканиями должен быть не менее 4 часов. Желательно использовать среднюю порцию утренней мочи.

Инструкция

Женщины: Раздвиньте половые губы

Мужчины: Отодвиньте крайнюю плоть

1. Начинайте мочеиспускание. Первую порцию мочи, не собирая, выпустите в унитаз. С первой порцией мочи смываются лишние загрязнения и продукты секреции мочеполовой системы.
2. Соберите среднюю порцию мочи в стерильный одноразовый стакан.
3. Уберите стакан и продолжите мочеиспускание в унитаз, чтобы последняя порция мочи не попала в емкость.
4. Перелейте 3-5 мл мочи в стерильную пробирку, выданную вам в лаборатории. Наклейте этикетку с вашими персональными данными на пробирку. Сохраняйте и перевозите анализ в прохладном месте, желательно в целлофановом пакете со льдом.
Важно: оставьте анализ в лаборатории/отделении как можно скорее, обязательно в тот же день.



Revisionsdatum